

Etude épidémiologique sur la pratique de l'interruption volontaire de grossesse au Japon

Tomohiro MATSUDA

Department of Epidemiology, National Institute of Public Health,
Ministry of Health, Labour & Welfare
Tel. : 048 458 6115 - Fax : 048 469 2677
E-mail : matsuda@niph.go.jp

Résumé :

Dans le contexte d'insuffisance de politique globale sur la santé reproductive après la guerre, la situation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) était « très libérale » au Japon malgré la limite de pratique seulement pour raisons sanitaires. Conséquemment la pratique de l'IVG reste très fréquente par rapport aux autres pays développés. Le taux de l'IVG parmi les adolescentes a augmenté rapidement, et a doublé depuis 10 ans (depuis l'année 1992), d'après le ministère de la santé.

La proportion d'adolescentes ayant recours à l'IVG est aussi plus grande, et le personnel médical considère ceci comme le symptôme de l'augmentation des jeunes ayant un rapport sexuel sans réfléchir sur une possibilité de grossesse. Ce travail a pour objectif de suivre l'évolution du nombre d'IVG au Japon entre 1955 et 2003, de calculer le ratio de l'IVG selon les départements, et finalement de réfléchir sur les facteurs modifiants.

Le ratio d'IVG était stable au niveau entre 600 à 300 depuis 1955, Cependant chez les femmes âgées (plus de 45 ans), le ratio a été diminué de 20 000 dans les années 80 à 5 000 en 2000. Par contre, celui chez les adolescentes a augmenté depuis le milieu des années 70. Le ratio était élevé dans le département de Akita, Tottori et Oita.

La diminution du ratio de l'IVG chez les femmes âgées est expliquée par le mariage à un âge tardif et le développement de technologie de la procréation médicalement assistée. Mais en générale le ratio est toujours beaucoup plus important que dans les autres pays développés. On critique l'insuffisance de l'éducation sexuelle à l'école ou de politique de santé efficace.

Abstract :

戦後の日本は、生殖にかかわる包括的な政策を欠いていたことが一因となり、墮胎天国と揶揄されるほどの高頻度に人工妊娠中絶を実施してきた。今日でも、他の先進国と比して日本の人工妊娠中絶割合（対 1,000 出生）は高いままであり、若年層においては状況は悪化しているという報告がある。1955 年よりの県別データを用いて、日本における人工妊娠中絶実施の推移の疫学的分析を行い、その背景を併せて考察することを本研究の目的とした。

日本での人工妊娠中絶割合は、総数で観察すれば 1955 年以来 600 から 300 の水準で、横ばいもしくは漸減している。しかしながら、年齢別にその推移を見ると、40 歳以上、特に 45 歳～49 歳の年齢層においては、1980 年代の水準 20,000 超に比して 2000 年には 5,000 を割り込んでいた。それとは対照的に、20 歳未満の若年層では、70 年代半ばより増加が顕著となり、90 年代後半には 2,000 に達していた。県別では秋田、鳥取、大分などの非常に高頻度な地域と宮崎、沖縄などの低頻度な地域との格差が際立った。

近年生殖技術の発達と、晩婚化の社会的背景から、高年齢の妊娠が人工妊娠中絶によって解決されることは少なくなった。しかしながら、それ以外の年齢層においては依然国際的に見て高頻度の望まない妊娠により、母体に肉体的、精神的に重度の負担がかかっていると考えられる。若年層における性行動の活発化を踏まえ、人工妊娠中絶の孕む保健医療、倫理の問題を極力回避できるように、効果のない現在までの対策を見直すことが必要である。